



የኩፍኝ በሽታ

3. የኩፍኝ በሽታ ምልክቶች

● ምልክቶች በሕፃናት ስድስት ወር በስተቀር ከተደፀፀ ከ 7-14 ቀናት ሕክምና ይጀምራል እና ከ4-8 ቀናት ይቆያል።

1. መግቢያ

ኩፍኝ ትኩሳት እና ቀይ ሽፍታ የሚያመጣ ተሳሳፊ የቫይረስ በሽታ ሲሆን፣ በአብዛኛው በሕፃናት ላይ ይከሰታል።


2. የኩፍኝ በሽታ መተሳሰልያ መንገዶች

- በመተንፈሻ ጠብቃዎች/ በመተንፈሻ ሕክሳት ፈሳሽ ወይም በአየር ንክኪ ሕመሞች
- ቫይረሱ በአየር ውስጥ ወይም በተጠከሩ የታዎች ላይ እስከ 2 ሰዓታት ድረስ ንቁ እና ተሳሳፊ ሆኖ ይቆያል።
- ክትባት ሳይከተብ ለበሽታው የተጋሰጠ ሰው
- የኩፍኝ በሽታ ያለበት ሰው በሽታውን የሚያስተሳልፈው፡ ሽፍታ ከመከሰቱ ከ4 ቀናት በፊት እና ከ4 ቀናት በኋላ ነው

የሕብረተሰብ ተሳትፎና ግንዛቤ ማስጨበጫ ንቅናቄ ማስተማሪያ ወ.መን ኢምፓውመንት-ኢክሽን ክፍያ ቅጽ ወረዳ ወይንም ጥበቃ ጽ/ቤት ጋር በመተባበር የተዘጋጀ



● ከባድ ሳል



● የዓይን መቅሳት



● ቀደይ ነጠብጣብ



● ማቅሰሽሰሽ



● የሕፃናት ፍሳሽ (ኮርይዛ)



● ከፍተኛ ትኩሳት

4. የበሽታው ተጠቂዎች

- በተጨማሪም የነገር ሁኔታ ውስጥ ያሉ ከ5 ዓመት በታች ሕፃናት፣
- የተመጣጠነ ምግብ አጥረት ወይም የቫይታሚን እና አጥረት ያሰጣቸው ሕፃናት
- የበሽታ መከላከያ ችግር ያሰጣቸው ሕፃናት
- ከ20 ዓመት አድራሻ በላይ ያላቸው አዋቂዎች
- የበሽታ መከላከያ የሲባቸው ነፍሰ ጡር አካላት



5. የኩፍኝ በሽታ ሕክምና

- ስኩፍኝ ቫይረስ የተለየ የፀረ-ቫይረስ ሕክምና መድኃኒት የለም
- ድጋፍ ሰጪ እንክብካቤ እንዲሁም የኩፍኝ በሽታ የሚያመጣቸው ችግሮችን መከላከል እና ማከም ነው።
- አንቲባዮቲክስ፡ ስህስተኛ ደረጃ በባክቴሪያ የሚመጡ ሺንፊክሽኖች ማስተም የዓይን እና የጆር ሺንፊክሽኖች/የሳንባ ምች በሽታዎችን ማከም።
- ቫይታሚን እና መስጠት
- ውጤታማ እንክብካቤና ድጋፍ ህክምና ከተደረገ በኩፍኝ በሽታ ምክንያት ሞት ሲወገድ ይቻላል።



Medicine



Wash Hands



Vaccine

6. የኩፍኝ በሽታ መከላከያ መንገዶች

- የኩፍኝ መከላከያ ክትባት
- የበሽታ የመከላከያ ሕትምን ማጠናከር-ይህም በተፈጥሮ የተገኘ (ከኩፍኝ በሽታ በኋላ)
- በሕፃናት የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ውስጥ ጡት ብቻ ማጥባት
- ጥሩ አመጋገብ (የቫይታሚን እና ንጥረ ነገር ያላቸውን ምግቦች መጠቀም)
- ጥሩ የግል እና የሕክምና ንጹህና መጠበቅ

